



REAÇÕES ADVERSAS

Embora raramente, quando ingerido acidentalmente em grande quantidade, o cloreto de benzalcônio pode causar efeitos adversos, tais como: náuseas e vômitos, além de inquietação, apreensão, fraqueza, confusão, dispnéia, cianose, hipotensão, convulsões e coma (a paralisia da musculatura respiratória pode levar à morte).


ALTERAÇÕES EM EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS

Até o momento não há relatos de alterações causadas por Neosoro infantil.

INSTRUÇÕES DE USO

Preparar o frasco de Neosoro infantil antes do uso, da seguinte maneira:

- 1) Aconselha-se lavar o conta-gotas antes do uso, em água quente.
- 2) Retire, e despreze a tampa do plástico que fecha o vidro.
- 3) Aspire o líquido, pressionando a parte superior de borracha do conta-gotas e instile seu conteúdo nas narinas. Evite tocar o conta-gotas nas narinas.
- 4) O conta-gotas funciona como tampa. Mantenha-o dentro do frasco após o uso.



POSOLOGIA

Instilar em cada narina, 2 a 4 gotas, 4 a 6 vezes ao dia, principalmente à noite ao deitar. Qualquer outra posologia, consultar o médico pediatra.

SUPERDOSE

Em caso de superdose, o médico deve ser imediatamente avisado, de modo a instituir a terapêutica adequada.

PACIENTES IDOSOS

Não há nenhuma restrição quanto ao uso de Neosoro infantil em pacientes idosos (acima de 60 anos).

Registro M.S nº 1.0465.0303
Farm. Responsável: Dr. Marco Aurélio Limirio G. Filho - CRF-GO nº 3.524
Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: **VIDE CARTUCHO**

Prezado Cliente:

Você acaba de receber um produto **Neo Química**.

Em caso de alguma dúvida quanto ao produto, lote, data de fabricação,
ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.



Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.

VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 4 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-020

www.neoquimica.com.br

C.N.P.J.: 29.785.870/0001-03 - Indústria Brasileira

Faber
Print
700 - 00102
3006676 - 10/2007

NEOSORO

Infantil

cloreto de benzalcônio
cloreto de sódio



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução nasal: Embalagem contendo frasco de vidro com 30 mL acompanhado de conta-gotas.

USO PEDIÁTRICO

USO NASAL

COMPOSIÇÃO

Cada mL da solução nasal contém:

cloreto de benzalcônio.....	0,1mg
cloreto de sódio.....	9,0mg
veículo q.s.p.....	1mL (água)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- Neosoro infantil é um produto fluidificante e anti-séptico nasal.
- Conservar em temperatura ambiente (15° a 30° C). Proteger da luz.
- Prazo de validade: **VIDE CARTUCHO**. Não use medicamento com o prazo de validade vencido; poderá ocorrer diminuição significativa do seu efeito terapêutico.
- "Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término". "Informe seu médico se está amamentando".
- "Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica".
- "O tratamento pode ser interrompido a qualquer momento sem causar danos ao paciente".
- "Informe seu médico o aparecimento de qualquer reação desagradável durante o tratamento".
- **"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"**.
- Até o momento não foi observado nenhuma evidência de interação medicamentosa com Neosoro infantil.
- O uso do produto é contra-indicado para pacientes com antecedentes de hipersensibilidade ao cloreto de benzalcônio.
- Os frascos de Neosoro infantil devem ser utilizados apenas por uma pessoa, a fim de evitar disseminação de infecções.
- "Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando antes do início ou durante o tratamento".
- **"NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE"**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O cloreto de benzalcônio é um tensoativo catiônico do grupo dos compostos de amônio quaternário. Sua atividade anti-séptica se deve à desnaturação ou coagulação da proteína bacteriana. É ativo contra bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e fungos. O cloreto de sódio desempenha uma ação fundamental na manutenção da tensão osmótica do sangue e tecidos.

INDICAÇÕES

Como fluidificante e anti-séptico nasal. No tratamento auxiliar das rinites que acompanham gripes e resfriados.

CONTRA-INDICAÇÕES

É CONTRA-INDICADO PARA PACIENTES COM ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE AO CLORETO DE BENZALCÔNIO OU A OUTROS SAIS DE AMÔNIO QUATERNÁRIO. NÃO FORAM RELATADAS CONTRA-INDICAÇÕES ESPECÍFICAS.

PRECAUÇÕES

Por não conter substâncias vasoconstritoras, o uso do produto não sofre restrições. Mesmo sendo um produto de uso pediátrico, recomenda-se não utilizar durante a gravidez e lactação. Neste caso, deve ser utilizado somente sob prescrição médica.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Recomenda-se precaução no uso do produto nos pacientes em tratamento com inibidores da monoaminoxidase (IMAO). O cloreto de benzalcônio é incompatível com nitrato de prata.

