

# Optocare UL

## LUBRIFICANTE OFTÁLMICO

### COMPOSIÇÃO

Hidroxiopropilgumar, sorbitol, ácido bórico, edetato dissódico di-hidratado, cloreto de potássio, cloreto de sódio, propilenoglicol, polietilenglicol 400, aminometilpropanol e água purificada. Pode conter hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH.

### APRESENTAÇÃO

Cartucho com 1 frasco de 5 mL, 10 mL ou 15 mL de Optocare UL. Acompanha Instruções de Uso.

### INDICAÇÃO

O produto Optocare UL é indicado para lubrificação e hidratação ocular. Optocare UL é usado para alívio de ardência, irritação, ressecamento, desconforto, ardor, sensação de areia e corpo estranho, que podem ser provocados por fatores ambientais como poeira, fumaça, raios ultravioleta, calor seco (sauna), ar condicionado, vento, cosméticos, exposição prolongada a computadores e/ou aparelhos de televisão.

### MODO DE USO

Aplicar 1 a 2 gotas no(s) olho(s) afetado(s) sempre que necessário. Para proceder a aplicação, puxar delicadamente a pálpebra inferior para baixo até formar uma pequena bolsa.

### CONTRAINDICAÇÕES

Optocare UL é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Exclusivamente para uso externo.
- Seguir rigorosamente as instruções de seu médico especialista e as instruções de uso do produto.
- Não utilize o produto se for alérgico a qualquer um dos componentes da fórmula.
- Não utilize se houver alteração da cor do produto ou se este se tornar turvo.
- Para evitar contaminação não toque o conta-gotas do frasco em nenhuma superfície.
- Tampar após o uso.
- Caso ocorra dor, alterações na visão, vermelhidão ou irritação, ou se o desconforto ocular persistir por mais de 72 horas, interrompa o uso do produto e consulte seu oftalmologista.

- Não utilize se o lacre de segurança estiver violado ou ausente.
- Respeitar a data de validade marcada no produto.
- Descartar o restante da solução, em caso de sobra, após 20 semanas da abertura do frasco.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Em caso de ingestão, consultar um médico.
- Interromper o uso e consultar um médico em caso de aparecimento de reações indesejáveis.

### EVENTOS ADVERSOS

Não há relatos de reações adversas com o uso de Optocare UL.

### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C. O produto deve ser protegido da luz solar, umidade e não deve ser congelado.

### PRAZO DE VALIDADE

24 meses após data de fabricação.

PRODUTO ESTÉRIL (por filtração)  
NÃO USAR SE A EMBALAGEM ESTIVER ROMPIDA OU DESTAMPADA

### Fabricado por:

LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.  
Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439 | Distrito Industrial  
Porto Alegre | RS | Brasil | CEP 91790-005  
Fone/Fax: +55 51 3250.8256  
E-mail: lebon@laboratoriolebon.com.br  
Site: www.laboratoriolebon.com.br  
CNPJ: 87.375.952/0001-78  
Resp. Técnico: José Rosito Filho | CRF/RS: 713  
Registro ANVISA/MS: 80256510008  
INDÚSTRIA BRASILEIRA



### SERVIÇO DE ATENDIMENTO

(51) 3250.8256

lebon@laboratoriolebon.com.br