

# **Pergo (dicloridrato de hidroxizina)**

Bula para profissional de saúde

Eurofarma Laboratórios S.A.  
Solução oral  
2 mg/mL

**Pergo**  
dicloridrato de hidroxizina

---

**FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO**

---

Solução oral 2mg/mL: Embalagem contendo 1 frasco com 120mL.

**USO ORAL**

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada mL da solução contém:

dicloridrato de hidroxizina .....  
2,00mg

Excipientes: benzoato de sódio, sorbato de potássio, carmelose, ciclamato de sódio, sacarina sódica, glicerol, essência de cereja líquida, essência de framboesa líquida e água purificada.

---

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

---

**1. INDICAÇÕES**

Pergo (dicloridrato de hidroxizina) está indicado para alívio do prurido causado por condições alérgicas da pele, tais como: urticária, dermatite atópica e de contato, e do prurido decorrente de outras doenças sistêmicas.

**2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS**

A hidroxizina, princípio ativo do Pergo (dicloridrato de hidroxizina), é uma droga anti-histamínica potente, de longa duração e alta afinidade para os receptores H<sub>1</sub> da histamina. O bloqueio sobre estes receptores inibe a liberação de histamina e suas consequentes ações sistêmicas.

Admite-se que o prurido seja causado, em parte, pela histamina, que é o mais importante mediador liberado pelos basófilos e mastócitos sensibilizados pela IgE. A atividade da hidroxizina sobre o sistema nervoso central pode também contribuir para sua proeminente ação antipruriginosa. Apresenta ainda ações anticolinérgica e antiemética.

A hidroxizina é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal e metabolizada no fígado em vários metabólitos. A sua ação inicia-se em 15 a 30 minutos após a administração e dura de 4 a 6 horas. É eliminada basicamente pela urina.

**3. CONTRAINDICAÇÕES**

Este medicamento é contraindicado em pacientes que tenham demonstrado prévia hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Este medicamento é contraindicado durante a gravidez e amamentação.

Este medicamento é contraindicado para pacientes que fazem uso de substâncias depressoras do sistema nervoso central e álcool.

**4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Evite a ingestão de álcool durante o tratamento. Informe ao médico se você sofre de problemas de rins ou fígado, de crises epiléticas, de glaucoma, de doença de Parkinson ou se está tomando outros medicamentos.

Não interromper o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

**Gravidez e amamentação**

Os dados clínicos em seres humanos são insuficientes para estabelecer a segurança do uso de dicloridrato de hidroxizina durante a gravidez e a amamentação. Por este motivo, o seu uso está contraindicado nessas situações.

**Pacientes idosos**

Em pacientes idosos deve ser considerada a necessidade de redução das doses recomendadas, em função da possibilidade de aumento das reações adversas.

#### **Capacidade de dirigir e operar máquinas**

Tendo em vista a possibilidade de ocorrência de sonolência durante o uso de Pergo (dicloridrato de hidroxizina), os pacientes devem ser alertados quanto à condução de veículos, ao manuseio de máquinas perigosas e outros equipamentos que requeiram atenção.

#### **5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

A ação da hidroxizina pode ser potencializada quando administrada concomitantemente com agentes depressores do sistema nervoso central, tais como: narcóticos, analgésicos não narcóticos e barbitúricos. Portanto, quando houver indicação do uso de Pergo (dicloridrato de hidroxizina) e de depressores do SNC, a dose destes últimos deve ser reduzida.

Pergo (dicloridrato de hidroxizina) pode ter o seu efeito sedativo potencializado pelo álcool.

#### **6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO**

Pergo (dicloridrato de hidroxizina) deve ser mantido em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade.

O prazo de validade do medicamento é de 24 meses a partir da data de fabricação.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Pergo (dicloridrato de hidroxizina) apresenta-se como solução límpida, de incolor a levemente amarelada, sabor e odor de cereja e framboesa.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **7. POSOLOGIA E MODO DE USAR**

##### **Adultos**

A dose usual para os pacientes adultos é de 25mg, 3 a 4 vezes ao dia.

##### **Crianças**

A dose recomendada para crianças é de 0,7mg/kg de peso, 3 vezes ao dia.

#### **8. REAÇÕES ADVERSAS**

Sedação, sonolência (pode desaparecer após vários dias de terapia continuada) e secura na boca. Raramente podem aparecer crises convulsivas, tremor ou agitação.

Devido às atividades anti-colinérgicas e sobre o sistema nervoso central, apresentadas pela hidroxizina, podem ocorrer secura da boca e sonolência, geralmente de caráter moderado e transitório.

**Em caso de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em [www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br), ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.**

#### **9. SUPERDOSE**

A superdosagem pode causar sonolência muito acentuada. Neste caso, deve ser realizado tratamento sintomático e de suporte.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.**

Registro M.S.: 1.0043.1189

Farm. Resp.: Dra. Maria Benedita Pereira - CRF-SP 30.378

**Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 10/12/2015.**

#### **Fabricado por:**

**Geolab Indústria Farmacêutica S/A**

VP. 1B QD.08-B Módulos 01 a 08 - DAIA

Anápolis - GO

#### **Registrado por:**

Pergo\_sol\_oral\_V2\_VPS

*VERSÃO 02 – Esta versão altera a versão 01*



**EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.**  
Av. Ver. José Diniz, 3.465 - São Paulo - SP  
CNPJ 61.190.096/0001-92  
**Indústria Brasileira**



[www.eurofarma.com.br](http://www.eurofarma.com.br)  
0800-704-3876  
[euroatende@eurofarma.com.br](mailto:euroatende@eurofarma.com.br)

