

**Ultibro<sup>®</sup>**

**(maleato de indacaterol +  
brometo de glicopirrônio)**

Novartis Biociências SA

Cápsulas com pó para inalação

110 mcg + 50 mcg

Bula do Paciente

Site embalador: Novartis Pharma Stein AG

---

---

**ULTIBRO®**

maleato de indacaterol + brometo de glicopirrônio

**APRESENTAÇÕES**

Cápsulas com pó para inalação.

Ultibro® 110 mcg + 50 mcg

Embalagens contendo 12 ou 30 cápsulas acompanhadas de 1 inalador.

**VIA INALATÓRIA****USO ADULTO****COMPOSIÇÃO**

Cada cápsula contém 143 mcg de maleato de indacaterol (equivalente a 110 mcg de indacaterol) e 63 mcg de brometo de glicopirrônio (equivalente a 50 mcg de glicopirrônio).

Cada dose liberada (dose que sai do bocal do inalador) contém 110 mcg de maleato de indacaterol equivalente a 85 mcg de indacaterol e 54 de brometo de glicopirrônio equivalente a 43 mcg de glicopirrônio.

Excipientes: lactose monoidratada e estearato de magnésio.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Ultibro® é utilizado para facilitar a respiração em pessoas com dificuldade para respirar devido a uma doença pulmonar chamada doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) moderada, grave e muito grave. Quando inalado, ajuda a respirar mais facilmente.

Se você utilizar Ultibro® ele ajudará a reduzir os efeitos da DPOC no seu dia a dia.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Ultibro® contém as substâncias ativas chamadas maleato de indacaterol e brometo de glicopirrônio. O indacaterol é um agonista beta<sub>2</sub>-adrenérgico de longa duração e o glicopirrônio é um antagonista muscarínico de longa duração. Os medicamentos indacaterol e glicopirrônio pertencem a um grupo de medicamentos chamados broncodilatadores. Quando você inala Ultibro®, ele ajuda você a respirar mais facilmente.

Na DPOC, os músculos ao redor das vias aéreas se contraem, dificultando a respiração. Ultibro® bloqueia a contração destes músculos do pulmão e também relaxa os músculos das paredes das pequenas vias onde o ar passa no pulmão. Isto ajuda a abrir as vias aéreas, facilitando a passagem do ar para dentro e para fora do pulmão.

A combinação de indacaterol e glicopirrônio de Ultibro® apresentou um rápido início de ação dentro de 5 minutos após a inalação. O efeito se manteve constante durante o intervalo de 24 h entre as doses.

Se você tem dúvidas sobre como Ultibro® funciona ou porque este medicamento foi indicado a você, pergunte ao seu médico.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?****Não use Ultibro®**

- Se você já teve uma reação incomum ou uma reação alérgica aos princípios ativos, indacaterol ou glicopirrônio, ou a qualquer um dos componentes deste medicamento, listados no início desta bula.

Se isto se aplicar a você, **avise seu médico antes de usar** Ultibro®.

Se você acha que pode ser alérgico, converse com seu médico.

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Siga todas as instruções do seu médico, cuidadosamente. Elas podem diferir das informações gerais contidas nesta bula.

**Advertências e precauções**

**Antes de utilizar Ultibro®, informe seu médico** se alguma destas situações se aplica a você:

- Se você é asmático (neste caso, você não deve ser tratado com Ultibro®);
- Se você tiver problemas do coração;
- Se você sofre de convulsões ou crises epilépticas;

- Se você tem problemas da glândula tireoide;
- Se você sofre de diabetes;
- Se você está tomando medicamentos similares para a sua doença pulmonar (vide “Tomando outros medicamentos”);
- Se você tem problemas nos rins;
- Se você tem problemas graves no fígado;
- Se você tem um problema nos olhos chamado glaucoma de ângulo fechado;
- Se você tem dificuldade para urinar.

**Durante o tratamento com Ultibro<sup>®</sup>, informe seu médico imediatamente** se você sentir qualquer um dos sintomas abaixo:

- **Pare de tomar Ultibro<sup>®</sup> e avise seu médico imediatamente** se você sentir um aperto no peito, tosse, chiado ou falta de ar imediatamente após a inalação de Ultibro<sup>®</sup> (sinais de broncoespasmo paradoxal);
- **Pare de tomar Ultibro<sup>®</sup> e avise seu médico imediatamente** se você apresentar dificuldade para respirar ou engolir, inchaço da língua, lábios e face, erupção da pele e coceira (sinais de reação alérgica);
- Se seus sintomas da DPOC (falta de ar, chiado, tosse) não melhorarem ou se piorarem durante o seu tratamento;
- **Pare de tomar Ultibro<sup>®</sup> e avise seu médico imediatamente** se você tiver dor nos olhos ou desconforto, visão temporariamente embaçada, halos visuais ou imagens coloridas em associação com olhos vermelhos; estes podem ser sinais de um quadro agudo de glaucoma de ângulo fechado.

Ultibro<sup>®</sup> é utilizado para a manutenção do tratamento da DPOC. Não utilize Ultibro<sup>®</sup> para tratar crises agudas de falta de ar ou chiados.

### **Tomando outros medicamentos**

Avise o médico ou farmacêutico se você está tomando ou tomou recentemente quaisquer outros medicamentos, incluindo aqueles obtidos sem prescrição. Isto inclui em particular os seguintes medicamentos:

- Medicamentos utilizados para o tratamento da depressão (por ex.: antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoamino oxidase);
- Medicamentos utilizados para sua doença pulmonar que contêm substâncias parecidas (mesma classe) àquelas do Ultibro<sup>®</sup> (o uso destes medicamentos pode aumentar o risco de possíveis efeitos adversos);
- Medicamentos que reduzem o nível de potássio em seu sangue, incluindo diuréticos (utilizados para tratar pressão alta, por ex.: hidroclorotiazida), outros broncodilatadores como as metilxantinas utilizadas para problemas respiratórios (por ex.: teofilina) ou esteroides (por ex.: prednisolona);
- Betabloqueadores utilizados no tratamento da pressão alta ou de outros problemas do coração (por ex.: propranolol) ou no tratamento do glaucoma (por ex.: timolol).

### **Alimentos e bebidas**

Você pode inalar Ultibro<sup>®</sup> antes ou depois de comer ou beber.

### **Pacientes idosos (75 anos ou mais)**

Você pode usar Ultibro<sup>®</sup> se você tiver 75 anos de idade ou mais na mesma dose indicada para adultos.

### **Crianças e adolescentes (menores de 18 anos)**

Você não deve usar Ultibro<sup>®</sup> se tiver menos de 18 anos de idade.

### **Gravidez e lactação**

Se você está grávida, pensa que está grávida ou está planejando engravidar, ou se você está amamentando, avise seu médico. Ele discutirá com você se você pode utilizar Ultibro<sup>®</sup>.

Converse com seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Seu médico discutirá com você os potenciais riscos de usar Ultibro<sup>®</sup> durante a gravidez.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use este medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

**Efeitos sobre a habilidade de dirigir veículos e/ou operar máquinas**

Este medicamento tem pouca ou nenhuma influência sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. No entanto, a ocorrência de tontura pode influenciar na capacidade de conduzir e utilizar máquinas (ver item 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?)

## 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Ultibro® deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C) e protegido da umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características físicas e organolépticas: as cápsulas são amarelas transparentes contendo pó branco.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Sempre utilize este medicamento exatamente como seu médico ou farmacêutico o orientou. Verifique com seu médico ou farmacêutico se você estiver com dúvidas.

Não exceda a dose recomendada prescrita pelo seu médico.

### Quanto inalar de Ultibro®

A dose usual é inalar o conteúdo de uma cápsula ao dia. Não utilizar mais do que o indicado por seu médico.

### Quando inalar Ultibro®

Você só precisa inalar uma cápsula uma vez ao dia para te ajudar a respirar mais facilmente, uma vez que a ação de Ultibro® tem duração de 24 horas. Utilizar Ultibro® no mesmo horário todos os dias ajudará a minimizar seus sintomas ao longo do dia e noite e também te ajudará a lembrar de tomá-lo.

### Como utilizar Ultibro®

Nesta embalagem você encontrará um inalador e cápsulas (em blísteres) que contém o medicamento em pó para inalação.



- Utilize apenas o inalador contido nesta embalagem (inalador de Ultibro®) para inalar o pó das cápsulas.
- **Não engula as cápsulas.**
- As cápsulas devem ser sempre mantidas no blíster e apenas removidas imediatamente antes do uso.
- Retire o alumínio do blíster para abri-lo, não empurre a cápsula através do alumínio.
- Quando você começar uma nova embalagem, utilize um novo inalador de Ultibro® contido nesta nova embalagem.
- Descarte cada inalador após 30 dias de uso.




**Certifique-se de ler as instruções** sobre como utilizar o inalador de Ultibro®.

### Instruções para utilizar o inalador de Ultibro®


Esta parte da bula explica como utilizar e cuidar do seu inalador de Ultibro®. Leia atentamente e siga estas instruções. Se tiver alguma dúvida, **converse com seu médico ou farmacêutico.**

Por favor, leia todas as instruções de uso antes de usar o Ultibro®.

 <p><b>Inserir</b></p> <p><b>1</b></p>	 <p><b>Perfurar e soltar</b></p> <p><b>2</b></p>	 <p><b>Inspirar profundamente</b></p> <p><b>3</b></p>	 <p><b>Verificar se a cápsula está vazia</b></p> <p><b>Verifique</b></p>
---	---	---	---

 <p><b>Etapa 1a:</b> <b>Retire a tampa</b></p>  <p><b>Etapa 1b:</b> <b>Abra o inalador</b></p>  <p><b>Etapa 1c:</b> <b>Remova a cápsula</b> Separe um blister da cartela de blisteres. Abra o blister e retire a cápsula.</p>	 <p><b>Etapa 2a:</b> <b>Perfure a cápsula uma vez</b> Segure o inalador na posição vertical. Perfure a cápsula pressionando firmemente ambos os botões laterais ao mesmo tempo. Você deverá ouvir um barulho quando a cápsula é perfurada. Perfure a cápsula apenas uma vez.</p>  <p><b>Etapa 2b:</b> <b>Solte os botões laterais</b></p>	 <p><b>Etapa 3a:</b> <b>Expire completamente</b> Não assopre no inalador.</p>  <p><b>Etapa 3b:</b> <b>Inale o medicamento profundamente</b> Segure o inalador como mostrado na figura. Coloque o bocal na boca e feche os lábios firmemente em torno dele. Não pressione os botões laterais. Inspire rapidamente e tão profundamente quanto puder. Durante a inspiração, você ouvirá um zumbido. Você pode sentir o gosto do remédio enquanto inala.</p>	 <p><b>Verifique se a cápsula está vazia</b> Abra o inalador para ver se ficou algum pó na cápsula.</p> <p>Se houver resíduo de pó na cápsula: Feche o inalador. Repita os passos 3a a 3c.</p>  <p>Pó remanescente      Vazio</p>  <p><b>Remova a cápsula vazia</b> Coloque a cápsula vazia no seu lixo doméstico. Feche o inalador e recoloque a tampa.</p>
<p><b>Não empurre a cápsula através da cartela. Não engula a cápsula.</b></p>  <p><b>Etapa 1d:</b> <b>Insira a cápsula</b> Nunca coloque uma cápsula diretamente no bocal.</p>		 <p><b>Etapa 3c:</b> <b>Segure a respiração</b> Prenda a respiração por até 5 segundos.</p>	<p><b>Informações importantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• As cápsulas de Ultibro® devem ser sempre conservadas no blister e retiradas apenas imediatamente antes do uso.</li> <li>• Não empurre a cápsula através da cartela para removê-la do blister.</li> <li>• Não engula a cápsula.</li> <li>• Não use as cápsulas de Ultibro® com qualquer outro inalador.</li> <li>• Não utilize o inalador Ultibro® para tomar qualquer outro medicamento em cápsulas.</li> <li>• Nunca coloque a cápsula na boca ou no bocal do inalador.</li> </ul>

 <p>Etapa 1e: <b>Feche o inalador</b></p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não pressione os botões laterais mais de uma vez.</li> <li>• Não assope no bocal.</li> <li>• Não pressione os botões laterais enquanto inspira através do bocal.</li> <li>• Não manipule as cápsulas com as mãos molhadas.</li> <li>• Nunca lave o seu inalador com água.</li> </ul>
--	--	--	---

<p>Sua embalagem de Ultibro<sup>®</sup> contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um inalador de Ultibro<sup>®</sup></li> <li>• Um ou mais blisters, cada um contendo 6 ou 10 cápsulas de Ultibro<sup>®</sup> para serem utilizadas no inalador</li> </ul> 	<p><b>Perguntas Frequentes:</b></p> <p><b>Por que o inalador não fez barulho quando eu inalei?</b> A cápsula pode estar presa no compartimento da cápsula. Se isso acontecer, solte cuidadosamente a cápsula batendo na base do inalador. Inale novamente o medicamento repetindo os passos 3a a 3c.</p> <p><b>O que devo fazer se houver resíduo de pó dentro da cápsula?</b> Você não recebeu o suficiente do seu medicamento. Feche o inalador e repita os passos 3a a 3c.</p> <p><b>Eu tossi depois de inalar - isso importa?</b> Isso pode acontecer. Enquanto a cápsula estiver vazia, você recebeu o suficiente do seu medicamento.</p> <p><b>Senti pequenos pedaços da cápsula na minha língua - isso importa?</b> Isso pode acontecer. Não é prejudicial. As chances da cápsula quebrar em pedaços pequenos serão aumentadas se a cápsula for perfurada mais de uma vez.</p>	<p><b>Limpendo o inalador</b> Limpe o bocal dentro e fora com um pano limpo, seco e sem fiapos para remover qualquer resíduo de pó. Mantenha o inalador seco. Nunca lave o seu inalador com água.</p> <p><b>Descarte do inalador após o uso</b> Cada inalador deve ser descartado após todas as cápsulas terem sido utilizadas. Pergunte ao seu farmacêutico como descartar medicamentos e inaladores que já não são necessários.</p>
---	---	---

**Por quanto tempo continuar tomando Ultibro<sup>®</sup>**

Continue utilizando Ultibro<sup>®</sup> por quanto tempo seu médico indicar.

DPOC é uma doença crônica e você deverá utilizar Ultibro<sup>®</sup> todos os dias e não apenas quando tiver problemas para respirar ou outros sintomas da DPOC.

Se você tiver dúvidas sobre quanto tempo tomar Ultibro<sup>®</sup>, converse com seu médico ou farmacêutico.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você se esquecer de tomar uma dose, tome uma dose assim que possível. No entanto, não inale duas doses no mesmo dia. Tome a próxima dose no horário habitual.

---

---

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Assim como com todos os medicamentos, pacientes utilizando Ultibro<sup>®</sup> podem apresentar reações adversas embora nem todos os apresentem.

### **Algumas reações adversas podem ser graves**

Se você sentir quaisquer reações adversas graves, **pare de tomar este medicamento e informe o seu médico imediatamente.**

#### **Comum (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Sede excessiva, urinar frequentemente, aumento do apetite com perda de peso, cansaço (altos níveis de açúcar no sangue, conhecido como hiperglicemia);
- Dificuldade para respirar ou engolir, inchaço da língua, lábios e face, erupção da pele, coceira e urticária (sinais de reação alérgica).

#### **Incomum (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Alterações na visão, pressão do olho aumentada, turvação temporária da visão, halos visuais ou imagens coloridas associadas com olhos vermelhos (estes podem ser sinais de glaucoma);
- Dor em aperto no peito com aumento do suor (sinais de suprimento de sangue e oxigênio insuficientes no coração, que pode ser sinal de um sério problema no coração, tal como doença cardíaca isquêmica);
- Batimentos cardíacos irregulares;
- Dificuldade para respirar com chiado ou tosse (sinais de broncoespasmo paradoxal).

#### **Frequência desconhecida (estas reações também podem ocorrer, no entanto, a frequência é desconhecida)**

- Inchaço principalmente na língua, lábios, face e garganta (possíveis sinais de angioedema).

### **Outras reações adversas possíveis**

Outras reações adversas incluem as seguintes listadas abaixo. Se estas reações adversas se tornarem graves, informe o seu médico, farmacêutico ou profissional de saúde.

#### **Muito comuns (ocorrem em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Nariz entupido, espirros, tosse, dor de cabeça com ou sem febre (sinais de infecção do trato respiratório superior).

#### **Comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Combinação de dor de garganta, coriza (sinais de nasofaringite);
- Infecção do trato urinário: dor para urinar e urinar frequentemente (sinais de cistite);
- Sensação de pressão ou dor nas bochechas e testa (possíveis sintomas de sinusite ou congestão sinusal);
- Coriza ou nariz entupido;
- Tontura;
- Dor de cabeça;
- Tosse;
- Garganta inflamada;
- Mal-estar estomacal, indigestão;
- Cáries;
- Febre;
- Dor no peito;
- Dificuldade e dor para urinar (possíveis sinais de obstrução da bexiga ou retenção urinária).

#### **Incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Dor nos músculos, ligamentos, tendões, articulações e ossos;
- Problemas para dormir;
- Batimento cardíaco acelerado;
- Palpitações (sinais de batimentos cardíacos anormais);
- Boca seca;
- Coceira/erupção da pele;
- Espasmo muscular;
- Dor ou desconforto muscular;
- Sangramento do nariz;
- Inchaço das mãos, tornozelos e pés;

- Cansaço;
- Náusea, vômitos, diarreia e dor abdominal (possíveis sinais de gastroenterite);
- Dor nas extremidades (por ex.: braços e pernas).

**Raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Formigamento ou dormência, sensibilidade da pele diminuída.

**Frequência é desconhecida (frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis)**

- Alteração da voz (rouquidão).

Se você notar qualquer outro efeito não mencionado nesta bula, por favor, informe seu médico ou farmacêutico.

**Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico ou cirurgião-dentista.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?**

Se você inalou mais Ultibro® do que deveria ou se alguém acidentalmente utilizou seu medicamento, contate um médico ou hospital imediatamente. Mostre a embalagem de Ultibro®. Cuidados médicos podem ser necessários.

Se você inalou Ultibro® demais ou se alguém inalou acidentalmente seu medicamento, as seguintes reações podem acontecer:

- Sinais e sintomas anticolinérgicos relacionados ao componente glicopirrônio, tais como náusea, vômitos, vertigem, tontura e visão embaçada.
- Eventos adversos relacionados ao componente indacaterol, tais como batimentos cardíacos irregulares ou acelerados, respiração rápida, confusão, cansaço (sinais de acidose metabólica), fraqueza muscular, espasmo muscular, batimentos cardíacos irregulares (baixos níveis de potássio no sangue), tremores, dores de cabeça, náuseas, vômitos, tontura ou níveis elevados de açúcar no sangue.

Se você acha que está apresentando qualquer um dos eventos adversos acima, contate um médico ou hospital para recomendações imediatamente. Apresente a caixa de Ultibro®. Atenção médica pode ser necessária.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS**

MS 1.0068.1123

Farm. Resp.: Flávia Regina Pegorer – CRF-SP 18.150.

**Importado por:** Novartis Biociências S.A.

Av. Prof. Vicente Rao, 90 – São Paulo – SP

CNPJ: 56.994.502/0001-30

Indústria Brasileira

**Fabricado por:** Novartis Pharma Stein AG, Stein, Suíça.

**Embalado por:** Novartis Pharma Stein AG, Stein, Suíça.

® = Marca registrada de Novartis AG, Basileia, Suíça.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**



BPL 23.06.20

2020-PSB/GLC-1126-s

VP6

**Ultibro<sup>®</sup>**

**(maleato de indacaterol +  
brometo de glicopirrônio)**

Novartis Biociências SA

Cápsulas com pó para inalação

110 mcg + 50 mcg

Bula do Paciente

Site embalador: Novartis Farmacéutica SA

---

**ULTIBRO®**

maleato de indacaterol + brometo de glicopirrônio

**APRESENTAÇÕES**

Cápsulas com pó para inalação.

Ultibro® 110 mcg + 50 mcg

Embalagens contendo 10 ou 30 cápsulas acompanhadas de 1 inalador.

**VIA INALATÓRIA****USO ADULTO****COMPOSIÇÃO**

Cada cápsula contém 143 mcg de maleato de indacaterol (equivalente a 110 mcg de indacaterol) e 63 mcg de brometo de glicopirrônio (equivalente a 50 mcg de glicopirrônio).

Cada dose liberada (dose que sai do bocal do inalador) contém 110 mcg de maleato de indacaterol equivalente a 85 mcg de indacaterol e 54 de brometo de glicopirrônio equivalente a 43 mcg de glicopirrônio.

Excipientes: lactose monoidratada e estearato de magnésio.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Ultibro® é utilizado para facilitar a respiração em pessoas com dificuldade para respirar devido a uma doença pulmonar chamada doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) moderada, grave e muito grave. Quando inalado, ajuda a respirar mais facilmente.

Se você utilizar Ultibro® ele ajudará a reduzir os efeitos da DPOC no seu dia a dia.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Ultibro® contém as substâncias ativas chamadas maleato de indacaterol e brometo de glicopirrônio. O indacaterol é um agonista beta<sub>2</sub>-adrenérgico de longa duração e o glicopirrônio é um antagonista muscarínico de longa duração. Os medicamentos indacaterol e glicopirrônio pertencem a um grupo de medicamentos chamados broncodilatadores. Quando você inala Ultibro®, ele ajuda você a respirar mais facilmente.

Na DPOC, os músculos ao redor das vias aéreas se contraem, dificultando a respiração. Ultibro® bloqueia a contração destes músculos do pulmão e também relaxa os músculos das paredes das pequenas vias onde o ar passa no pulmão. Isto ajuda a abrir as vias aéreas, facilitando a passagem do ar para dentro e para fora do pulmão.

A combinação de indacaterol e glicopirrônio de Ultibro® apresentou um rápido início de ação dentro de 5 minutos após a inalação. O efeito se manteve constante durante o intervalo de 24 h entre as doses.

Se você tem dúvidas sobre como Ultibro® funciona ou porque este medicamento foi indicado a você, pergunte ao seu médico.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?****Não use Ultibro®**

- Se você já teve uma reação incomum ou uma reação alérgica aos princípios ativos, indacaterol ou glicopirrônio, ou a qualquer um dos componentes deste medicamento, listados no início desta bula.

Se isto se aplicar a você, **avise seu médico antes de usar** Ultibro®.

Se você acha que pode ser alérgico, converse com seu médico.

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Siga todas as instruções do seu médico, cuidadosamente. Elas podem diferir das informações gerais contidas nesta bula.

**Advertências e precauções**

**Antes de utilizar Ultibro®, informe seu médico** se alguma destas situações se aplica a você:

- Se você é asmático (neste caso, você não deve ser tratado com Ultibro®);
- Se você tiver problemas do coração;
- Se você sofre de convulsões ou crises epilépticas;
- Se você tem problemas da glândula tireoide;

- Se você sofre de diabetes;
- Se você está tomando medicamentos similares para a sua doença pulmonar (vide “Tomando outros medicamentos”);
- Se você tem problemas nos rins;
- Se você tem problemas graves no fígado;
- Se você tem um problema nos olhos chamado glaucoma de ângulo fechado;
- Se você tem dificuldade para urinar.

**Durante o tratamento com Ultibro<sup>®</sup>, informe seu médico imediatamente** se você sentir qualquer um dos sintomas abaixo:

- **Pare de tomar Ultibro<sup>®</sup> e avise seu médico imediatamente** se você sentir um aperto no peito, tosse, chiado ou falta de ar imediatamente após a inalação de Ultibro<sup>®</sup> (sinais de broncoespasmo paradoxal);
- **Pare de tomar Ultibro<sup>®</sup> e avise seu médico imediatamente** se você apresentar dificuldade para respirar ou engolir, inchaço da língua, lábios e face, erupção da pele e coceira (sinais de reação alérgica);
- Se seus sintomas da DPOC (falta de ar, chiado, tosse) não melhorarem ou se piorarem durante o seu tratamento;
- **Pare de tomar Ultibro<sup>®</sup> e avise seu médico imediatamente** se você tiver dor nos olhos ou desconforto, visão temporariamente embaçada, halos visuais ou imagens coloridas em associação com olhos vermelhos; estes podem ser sinais de um quadro agudo de glaucoma de ângulo fechado.

Ultibro<sup>®</sup> é utilizado para a manutenção do tratamento da DPOC. Não utilize Ultibro<sup>®</sup> para tratar crises agudas de falta de ar ou chiados.

### **Tomando outros medicamentos**

Avise o médico ou farmacêutico se você está tomando ou tomou recentemente quaisquer outros medicamentos, incluindo aqueles obtidos sem prescrição. Isto inclui em particular os seguintes medicamentos:

- Medicamentos utilizados para o tratamento da depressão (por ex.: antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoamino oxidase);
- Medicamentos utilizados para sua doença pulmonar que contêm substâncias parecidas (mesma classe) àquelas do Ultibro<sup>®</sup> (o uso destes medicamentos pode aumentar o risco de possíveis efeitos adversos);
- Medicamentos que reduzem o nível de potássio em seu sangue, incluindo diuréticos (utilizados para tratar pressão alta, por ex.: hidroclorotiazida), outros broncodilatadores como as metilxantinas utilizadas para problemas respiratórios (por ex.: teofilina) ou esteroides (por ex.: prednisolona);
- Betabloqueadores utilizados no tratamento da pressão alta ou de outros problemas do coração (por ex.: propranolol) ou no tratamento do glaucoma (por ex.: timolol).

### **Alimentos e bebidas**

Você pode inalar Ultibro<sup>®</sup> antes ou depois de comer ou beber.

### **Pacientes idosos (75 anos ou mais)**

Você pode usar Ultibro<sup>®</sup> se você tiver 75 anos de idade ou mais na mesma dose indicada para adultos.

### **Crianças e adolescentes (menores de 18 anos)**

Você não deve usar Ultibro<sup>®</sup> se tiver menos de 18 anos de idade.

### **Gravidez e lactação**

Se você está grávida, pensa que está grávida ou está planejando engravidar, ou se você está amamentando, avise seu médico. Ele discutirá com você se você pode utilizar Ultibro<sup>®</sup>.

Converse com seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Seu médico discutirá com você os potenciais riscos de usar Ultibro<sup>®</sup> durante a gravidez.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use este medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

### **Efeitos sobre a habilidade de dirigir veículos e/ou operar máquinas**

Este medicamento tem pouca ou nenhuma influência sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. No entanto, a ocorrência de tontura pode influenciar na capacidade de conduzir e utilizar máquinas (ver item 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?)

## 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Ultibro<sup>®</sup> deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C) e protegido da umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características físicas e organolépticas: as cápsulas são amarelas transparentes contendo pó branco.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Sempre utilize este medicamento exatamente como seu médico ou farmacêutico o orientou. Verifique com seu médico ou farmacêutico se você estiver com dúvidas.

Não exceda a dose recomendada prescrita pelo seu médico.

### Quanto inalar de Ultibro<sup>®</sup>

A dose usual é inalar o conteúdo de uma cápsula ao dia. Não utilizar mais do que o indicado por seu médico.

### Quando inalar Ultibro<sup>®</sup>

Você só precisa inalar uma cápsula uma vez ao dia para te ajudar a respirar mais facilmente, uma vez que a ação de Ultibro<sup>®</sup> tem duração de 24 horas. Utilizar Ultibro<sup>®</sup> no mesmo horário todos os dias ajudará a minimizar seus sintomas ao longo do dia e noite e também te ajudará a lembrar de tomá-lo.

### Como utilizar Ultibro<sup>®</sup>

Nesta embalagem você encontrará um inalador e cápsulas (em blísteres) que contém o medicamento em pó para inalação.


- Utilize apenas o inalador contido nesta embalagem (inalador de Ultibro<sup>®</sup>) para inalar o pó das cápsulas.
- **Não engula as cápsulas.**
- As cápsulas devem ser sempre mantidas no blíster e apenas removidas imediatamente antes do uso.
- Retire o alumínio do blíster para abri-lo, não empurre a cápsula através do alumínio.
- Quando você começar uma nova embalagem, utilize um novo inalador de Ultibro<sup>®</sup> contido nesta nova embalagem.
- Descarte cada inalador após 30 dias de uso.


**Certifique-se de ler as instruções** sobre como utilizar o inalador de Ultibro<sup>®</sup>.

### Instruções para utilizar o inalador de Ultibro<sup>®</sup>

Esta parte da bula explica como utilizar e cuidar do seu inalador de Ultibro<sup>®</sup>. Leia atentamente e siga estas instruções.

Se tiver alguma dúvida, **converse com seu médico ou farmacêutico.**







Etapa 1a:  
**Retire a tampa**



Etapa 1b:  
**Abra o inalador**



Etapa 1c:  
**Remova a cápsula**  
Separe um blister da cartela de blisters. Abra o blister e retire a cápsula.

**Não empurre a cápsula através da cartela. Não engula a cápsula.**



Etapa 1d:  
**Insira a cápsula**  
Nunca coloque uma cápsula diretamente no bocal.



Etapa 2a:  
**Perfure a cápsula uma vez**

Segure o inalador na posição vertical. Perfure a cápsula pressionando firmemente ambos os botões laterais ao mesmo tempo. Você deverá ouvir um barulho quando a cápsula é perfurada. Perfure a cápsula apenas uma vez.



Etapa 2b:  
**Solte os botões laterais**



Etapa 3a:  
**Expire completamente**  
Não assope no inalador.




Etapa 3b:  
**Inale o medicamento profundamente**

Segure o inalador como mostrado na figura. Coloque o bocal na boca e feche os lábios firmemente em torno dele. Não pressione os botões laterais. Inspire rapidamente e tão profundamente quanto puder. Durante a inspiração, você ouvirá um zumbido. Você pode sentir o gosto do remédio enquanto inala.



Etapa 3c:  
**Segure a respiração**  
Prenda a respiração por até 5 segundos.



**Verifique se a cápsula está vazia**

Abra o inalador para ver se ficou algum pó na cápsula.

Se houver resíduo de pó na cápsula: Feche o inalador. Repita os passos 3a a 3c.



Pó remanescente Vazio




**Remova a cápsula vazia**  
Coloque a cápsula vazia no seu lixo doméstico. Feche o inalador e recoloque a tampa.

#### **Informações importantes**

- As cápsulas de Ultibro® devem ser sempre conservadas no blister e retiradas apenas imediatamente antes do uso.
- Não empurre a cápsula através da cartela para removê-la do blister.
- Não engula a cápsula.
- Não use as cápsulas de Ultibro® com qualquer outro inalador.
- Não utilize o inalador Ultibro® para tomar qualquer outro medicamento em cápsulas.
- Nunca coloque a cápsula na boca ou no bocal do inalador
- Não pressione os botões laterais mais de uma vez.
- Não assope no bocal.

 <p>Etapa 1e: <b>Feche o inalador</b></p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não pressione os botões laterais enquanto inspira através do bocal.</li> <li>• Não manipule as cápsulas com as mãos molhadas.</li> <li>• Nunca lave o seu inalador com água.</li> </ul>
--	--	--	--

<p>Sua embalagem de Ultibro® contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um inalador de Ultibro®</li> <li>• Um ou mais blisters, cada um contendo 6 ou 10 cápsulas de Ultibro® para serem utilizadas no inalador</li> </ul> 	<p><b>Perguntas Frequentes:</b></p> <p><b>Por que o inalador não fez barulho quando eu inalei?</b> A cápsula pode estar presa no compartimento da cápsula. Se isso acontecer, solte cuidadosamente a cápsula batendo na base do inalador. Inale novamente o medicamento repetindo os passos 3a a 3c.</p> <p><b>O que devo fazer se houver resíduo de pó dentro da cápsula?</b> Você não recebeu o suficiente do seu medicamento. Feche o inalador e repita os passos 3a a 3c.</p> <p><b>Eu tossi depois de inalar - isso importa?</b> Isso pode acontecer. Enquanto a cápsula estiver vazia, você recebeu o suficiente do seu medicamento.</p> <p><b>Senti pequenos pedaços da cápsula na minha língua - isso importa?</b> Isso pode acontecer. Não é prejudicial. As chances da cápsula quebrar em pedaços pequenos serão aumentadas se a cápsula for perfurada mais de uma vez.</p>	<p><b>Limpendo o inalador</b> Limpe o bocal dentro e fora com um pano limpo, seco e sem fiapos para remover qualquer resíduo de pó. Mantenha o inalador seco. Nunca lave o seu inalador com água.</p> <p><b>Descarte do inalador após o uso</b> Cada inalador deve ser descartado após todas as cápsulas terem sido utilizadas. Pergunte ao seu farmacêutico como descartar medicamentos e inaladores que já não são necessários.</p>
--	---	---

#### **Por quanto tempo continuar tomando Ultibro®**

Continue utilizando Ultibro® por quanto tempo seu médico indicar.

DPOC é uma doença crônica e você deverá utilizar Ultibro® todos os dias e não apenas quando tiver problemas para respirar ou outros sintomas da DPOC.

Se você tiver dúvidas sobre quanto tempo tomar Ultibro®, converse com seu médico ou farmacêutico.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você se esquecer de tomar uma dose, tome uma dose assim que possível. No entanto, não inale duas doses no mesmo dia. Tome a próxima dose no horário habitual.

---

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Assim como com todos os medicamentos, pacientes utilizando Ultibro® podem apresentar reações adversas embora nem todos os apresentem.

### **Algumas reações adversas podem ser graves**

Se você sentir quaisquer reações adversas graves, **pare de tomar este medicamento e informe o seu médico imediatamente.**

#### **Comum (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Sede excessiva, urinar frequentemente, aumento do apetite com perda de peso, cansaço (altos níveis de açúcar no sangue, conhecido como hiperglicemia);
- Dificuldade para respirar ou engolir, inchaço da língua, lábios e face, erupção da pele, coceira e urticária (sinais de reação alérgica).

#### **Incomum (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Alterações na visão, pressão do olho aumentada, turvação temporária da visão, halos visuais ou imagens coloridas associadas com olhos vermelhos (estes podem ser sinais de glaucoma);
- Dor em aperto no peito com aumento do suor (sinais de suprimento de sangue e oxigênio insuficientes no coração, que pode ser sinal de um sério problema no coração, tal como doença cardíaca isquêmica);
- Batimentos cardíacos irregulares;
- Dificuldade para respirar com chiado ou tosse (sinais de broncoespasmo paradoxal).

#### **Frequência desconhecida (estas reações também podem ocorrer, no entanto, a frequência é desconhecida)**

- Inchaço principalmente na língua, lábios, face e garganta (possíveis sinais de angioedema).

### **Outras reações adversas possíveis**

Outras reações adversas incluem as seguintes listadas abaixo. Se estas reações adversas se tornarem graves, informe o seu médico, farmacêutico ou profissional de saúde.

#### **Muito comuns (ocorrem em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Nariz entupido, espirros, tosse, dor de cabeça com ou sem febre (sinais de infecção do trato respiratório superior).

#### **Comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Combinação de dor de garganta, coriza (sinais de nasofaringite);
- Infecção do trato urinário: dor para urinar e urinar frequentemente (sinais de cistite);
- Sensação de pressão ou dor nas bochechas e testa (possíveis sintomas de sinusite ou congestão sinusal);
- Coriza ou nariz entupido;
- Tontura;
- Dor de cabeça;
- Tosse;
- Garganta inflamada;
- Mal-estar estomacal, indigestão;
- Cáries;
- Febre;
- Dor no peito;
- Dificuldade e dor para urinar (possíveis sinais de obstrução da bexiga ou retenção urinária).

#### **Incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Dor nos músculos, ligamentos, tendões, articulações e ossos;
- Problemas para dormir;
- Batimento cardíaco acelerado;
- Palpitações (sinais de batimentos cardíacos anormais);
- Boca seca;
- Coceira/erupção da pele;
- Espasmo muscular;
- Dor ou desconforto muscular;
- Sangramento do nariz;
- Inchaço das mãos, tornozelos e pés;
- Cansaço;

- Náusea, vômitos, diarreia e dor abdominal (possíveis sinais de gastroenterite);
- Dor nas extremidades (por ex.: braços e pernas).

**Raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Formigamento ou dormência, sensibilidade da pele diminuída.

**Frequência é desconhecida (frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis)**

- Alteração da voz (rouquidão).

Se você notar qualquer outro efeito não mencionado nesta bula, por favor, informe seu médico ou farmacêutico.

**Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico ou cirurgião-dentista.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

Se você inalou mais Ultibro® do que deveria ou se alguém acidentalmente utilizou seu medicamento, contate um médico ou hospital imediatamente. Mostre a embalagem de Ultibro®. Cuidados médicos podem ser necessários.

Se você inalou Ultibro® demais ou se alguém inalou acidentalmente seu medicamento, as seguintes reações podem acontecer:

- Sinais e sintomas anticolinérgicos relacionados ao componente glicopirrônio, tais como náusea, vômitos, vertigem, tontura e visão embaçada.
- Eventos adversos relacionados ao componente indacaterol, tais como batimentos cardíacos irregulares ou acelerados, respiração rápida, confusão, cansaço (sinais de acidose metabólica), fraqueza muscular, espasmo muscular, batimentos cardíacos irregulares (baixos níveis de potássio no sangue), tremores, dores de cabeça, náuseas, vômitos, tontura ou níveis elevados de açúcar no sangue.

Se você acha que está apresentando qualquer um dos eventos adversos acima, contate um médico ou hospital para recomendações imediatamente. Apresente a caixa de Ultibro®. Atenção médica pode ser necessária.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS**

MS 1.0068.1123

Farm. Resp.: Flávia Regina Pegorer – CRF-SP 18.150.

**Importado por:** Novartis Biociências S.A.

Av. Prof. Vicente Rao, 90 – São Paulo – SP

CNPJ: 56.994.502/0001-30

Indústria Brasileira

**Fabricado por:** Novartis Pharma Stein AG, Stein, Suíça ou Novartis Farmacéutica SA, Barberà Del Vallès, Barcelona, Espanha (vide cartucho).

® = Marca registrada de Novartis AG, Basileia, Suíça.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

BPL 23.06.20

2020-PSB/GLC-1126-s

VP7

### Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
22/07/2016	2123483/16-3	MEDICAMENTO NOVO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	27/09/2013	0824892/13-3	MEDICAMENTO NOVO – Registro de Nova Associação no País	28/03/2016	NA	VP1	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 12 + 1 INAL
							NA	VPS1	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 30 + 1 INAL
05/08/2016	2155344/16-1	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	05/08/2016	2155344/16-1	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	05/08/2016	- O que devo saber antes de usar este medicamento? - Como devo usar este medicamento? - Quais os males que este medicamento pode me causar?	VP2	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 12 + 1 INAL
							- Características farmacológicas - Advertências e precauções - Interações medicamentosas - Posologia e modo de usar - Reações adversas	VPS2	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 30 + 1 INAL
13/06/2018	0473215184	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	13/06/2018	0473215184	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	13/06/2018	- Para Que Este Medicamento é Indicado? - Como Este Medicamento Funciona? - Dizeres Legais	VP3	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 12 + 1 INAL
							- Reações adversas - Dizeres Legais	VPS3	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 30 + 1 INAL
31/10/2018	1047008185	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de	15/08/2016	2188871/16-0	10278 - MEDICAMENTO NOVO - Alteração	16/10/2018	NA	VP3	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 12 + 1 INAL
							- Resultados de eficácia	VPS4	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 12 + 1 INAL

Ultibro® (maleato de indacaterol + brometo de glicopirrônio) / Cápsula com pó para inalação / 110 mcg + 50 mcg

		Texto de Bula – RDC 60/12			de Texto de Bula				110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 30 + 1 INAL
14/05/2019	0435096191	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	14/05/2019	0435096191	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	14/05/2019	- Como devo usar este medicamento?	VP4	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 12 + 1 INAL
							- Características farmacológicas - Advertencias e precauções - Reações Adversas	VPS5	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 30 + 1 INAL
07/10/2019	2363243197	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	07/10/2019	2363243197	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	07/10/2019	- Como devo usar este medicamento?	VP3	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 12 + 1 INAL
							- Características farmacológicas - Advertencias e precauções - Reações Adversas	VPS4	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 30 + 1 INAL
08/11/2019	3071829195	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	11/10/2019	2444629197	11017 - RDC 73/2016 - NOVO - Inclusão de local de embalagem primária do medicamento	11/10/2019	- Dizeres Legais	VP4	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 12 + 1 INAL
							- Reações Adversas - Dizeres Legais	VPS5	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 30 + 1 INAL
07/05/2020	1424239207	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	16/10/2019	2509183192	11092 - RDC 73/2016 - NOVO - Inclusão de nova apresentação	03/02/2020	- Apresentações - Como devo usar este medicamento?	VP5	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 12 + 1 INAL
							- Apresentações - Características farmacológicas - Advertencias e precauções	VPS6	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 30 + 1 INAL
19/06/2020	1952655/20-5	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	20/05/2020	1610583/20-4	11023 - RDC 73/2016 - NOVO - Inclusão de local de fabricação de medicamento de liberação	20/05/2020	- Dizeres Legais	VP6	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 12 + 1 INAL
							- Dizeres Legais	VPS7	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 30 + 1 INAL

Ultibro® (maleato de indacaterol + brometo de glicopirrônio) / Cápsula com pó para inalação / 110 mcg + 50 mcg

					convencional				
22/07/2020	NA	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	22/07/2020	NA	MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	22/07/2020	- NA	VP6	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 12 + 1 INAL
							- Características farmacológicas - Advertencias e Precauções	VPS7	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 30 + 1 INAL Site Stein
							- NA	VP7	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 10 + 1 INAL
							- Características farmacológicas - Advertencias e Precauções	VPS8	110 MCG + 50 MCG CAP DURA PÓ INAL OR CT BL AL AL X 30 + 1 INAL Site Barbera

Ultibro® (maleato de indacaterol + brometo de glicopirrônio) / Cápsula com pó para inalação / 110 mcg + 50 mcg