

TEXTO DE BULA- XAROPE VICK

Informamos que o texto de bula é impresso na própria rotulagem do produto.

Vick®
Xarope
guaifenesina 200mg/15ml
EXPECTORANTE

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS

120 ml

Cada 15 ml do produto contém: guaifenesina: 200mg. Veículos: açúcar hidrolizado, propilenoglicol, álcool (4,25%), citrato de sódio, carboximetilcelulose de sódio, ácido cítrico anidro, estearato de polioxyl 40, benzoato de sódio, óxido de polietileno N.F., sacarina sódica, mentol, corante vermelho alimento 17, sistema flavorizante (chocolate artificial, mentol e “black cherry”), água deionizada.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

Contra-indicado em casos de hipersensibilidade a guaifenesina ou a qualquer componente do produto.

Cuidados de conservação e uso: Proteger da luz e umidade. Conservar a temperatura ambiente (15°C à 30°C).

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica. Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.

Ação do medicamento: esse medicamento é um xarope expectorante que ajuda na eliminação do catarro em tosse produtivas. A guaifenesina fluidifica o catarro, tornando-o menos viscoso e mais “solto”. Dessa forma, o catarro é expelido de maneira mais fácil.

Riscos do medicamento/Advertências: não tome este medicamento em caso de tosse crônica como a causada por asma, fumo, bronquite crônica ou enfisema, ou se a tosse vier acompanhada de muco excessivo, a menos que indicado por um médico. Não exceda a dose recomendada. Não utilize por mais de 5 dias. Consulte seu médico se a tosse persistir por mais de 5 dias, tender a reincidir, vier acompanhada de febre, erupções cutâneas, dor de garganta ou dor de cabeça persistente.

Atenção: Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela por portadores de diabetes.

Não deve ser administrado em crianças entre 2 e 6 anos de idade, a não ser que recomendado por um médico.

Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica.

Informe ao seu médico se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

Até o momento não foram descritas interações da guaifenesina com outros fármacos.

Modo de uso: o produto consiste de um xarope translúcido de cor avermelhada. Tomar a dose recomendada para o produto, de acordo com a faixa etária/peso, utilizando o copo dosador do produto. **Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.**

Posologia e administração:

Adultos e crianças maiores de 12 anos (mais de 43 Kg)	15 ml a cada 4 horas
Crianças de 6 a 12 anos (22 a 43Kg)	10 ml a cada 4 horas

Crianças entre 2 e 6 anos: somente em caso de recomendação médica. Não exceder 6 doses por dia. Em caso de esquecer uma dose, tome logo que possível, a menos que esteja perto da próxima dose; não tome dose dupla. Não existem recomendações especiais ou precauções sobre o uso do produto por pacientes idosos.

Reações adversas: pouco freqüentes ou raras- náuseas, vômitos, diarreia, erupção cutânea, dor de estômago, dor de cabeça, sonolência e vertigem.

Conduta em caso de superdosagem: o sintoma que caracteriza a superdosagem é o vômito. O indivíduo deve ser levado imediatamente ao atendimento médico emergencial sem que nenhuma outra conduta seja tomada.

Fabricado por Nycomed Pharma Ltda, Rodovia SP 340 s/n, Km 133,5 Jaguariúna – SP, CNPJ 60.397.775/0008-40. Para Procter & Gamble Higiene e Cosméticos LTDA, - Rua Francisco Pereira Dutra, 2405 - Galpão A - Estiva, CEP 13290-000 Louveira - SP. CNPJ: 67.712.562/0017-04. Indústria Brasileira. ®Marcas registradas por The Procter & Gamble Co. Farm. Resp.: Silvia C. M. de Freitas CRF/S.P. nº 29.871. MS: 1.2143.0004.002-2.

SAC: 0800 7015515 - Caixa Postal 19226 CEP 04505-970/São Paulo - SP.