

# BISOLVON

Cloridrato de bromexina

Uso pediátrico e adulto

## Formas farmacêuticas e apresentações - BISOLVON

Xarope expectorante: Frasco com 120 ml. Solução expectorante: Frasco com 50 ml.

## Composição - BISOLVON

Xarope expectorante: Cada 10 ml (1 copo-medida) contém: Cloridrato de bromexina, 8 mg. Excipientes: Acido tartárico, ácido benzóico, carboximetilcelulose sódica, glicerina, **sorbitol** a 70%, aroma de frutas 52504 T, álcool etílico, água desionizada. Solução expectorante: Cada ml (15 gotas) contém: Cloridrato de bromexina, 2 mg. Excipientes: Acido tartárico, metilparabeno, água desionizada.

## Informações ao paciente - BISOLVON

Conservar o medicamento em lugar fresco e seco, ao abrigo da luz. O prazo de validade do xarope expectorante e da solução expectorante é de 48 meses. Não tome medicamentos com o prazo de validade vencido. **BISOLVON** é um expectorante que facilita a remoção das secreções mucosas dos **brônquios**, aliviando consideravelmente a função respiratória. Com uso oral, o efeito inicia-se dentro de 5 horas. Com inalação, o efeito instala-se mais rapidamente, dentro de 15 a 20 minutos. Não usar o produto durante os primeiros três meses de **gravidez**. Mulheres que estejam amamentando devem evitar o uso do produto. Não se conhece incompatibilidade com outros medicamentos. Como **efeitos colaterais**, podem ocorrer manifestações gastrintestinais e reações alérgicas. Se ocorrerem reações desagradáveis graves, procure orientação médica.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

## Informações técnicas - BISOLVON

**BISOLVON** é um secretolítico broncopulmonar com características terapêuticas originais. Por um lado, promove ação secretomotora com aumento da quantidade de expectoração. Por outro lado, pela sua ação secretolítica, produz a fluidificação das secreções mucosas espessas contidas na árvore traqueobrônquica, por redução da **viscosidade** do muco, facilitando com isto a expectoração e aliviando a tosse. A ação terapêutica plena é alcançada ao cabo de alguns dias de administração, pelo que se aconselha não interromper a terapêutica precocemente. Nos casos crônicos é necessário instituir um tratamento prolongado.

## Indicações - BISOLVON

Como terapêutica secretolítica e expectorante nas afecções broncopulmonares agudas e crônicas, associadas a secreção **MUCOSA** anormal e a transtornos do transporte mucoso.

## Contra-indicações - BISOLVON

Hipersensibilidade conhecida à bromexina e a outros componentes da fórmula.

## Gravidez e lactação - BISOLVON

Estudos pré-clínicos e a ampla experiência clínica disponível não evidenciaram efeitos prejudiciais durante a gravidez. Mesmo assim, devem ser observadas as precauções habituais a respeito do uso de fármacos durante a gravidez, sobretudo durante o primeiro trimestre. Bromexina ou seus metabólitos passam para o leite materno, pelo que deve ser evitado o uso do produto em mulheres que estejam amamentando.

## Interações medicamentosas - BISOLVON

Desconhecem-se interações prejudiciais. A administração de bromexina juntamente com antibióticos (amoxicilina, cefuroxima, eritromicina, doxiciclina) produz concentrações antibióticas mais elevadas no tecido pulmonar.

## Reações adversas - BISOLVON

**BISOLVON** é geralmente bem-tolerado. Como efeitos colaterais, foram relatadas manifestações gastrointestinais leves. Em raros casos podem ocorrer reações alérgicas, sobretudo erupções cutâneas.

## Observação - BISOLVON

Convém lembrar aos pacientes que durante o tratamento há de se esperar um aumento da secreção brônquica. Não existem restrições ou precauções especiais para o uso do produto em pacientes com idade acima de 65 anos.

## Posologia - BISOLVON

Xarope expectorante: Adultos e crianças acima de 12 anos: 1 copo-medida (10 ml), 3 vezes ao dia. Crianças de 6 a 12 anos: 1/2 copo-medida (5 ml), 3 vezes ao dia. Crianças de 2 a 6 anos: 1/4 copo-medida (2,5 ml), 3 vezes ao dia. Crianças menores de 2 anos: 1/8 copo-medida (1,25 ml), 3 vezes ao dia.

Solução expectorante: O novo frasco de **BISOLVON** vem acompanhado de um moderno tipo de gotejador, de fácil manuseio: basta colocar o frasco em posição vertical deixar escorrer a quantidade desejada de gotas.

Adultos e crianças acima de 12 anos: 4 ml (60 gotas), 3 vezes ao dia.

Crianças de 6 a 12 anos: 2 ml (30 gotas), 3 vezes ao dia.

Crianças de 2 a 6 anos: 20 gotas, 3 vezes ao dia.

Crianças menores de 2 anos: 10 gotas, 3 vezes ao dia.

1. Romper o lacre da tampa.
2. Virar o frasco.
3. Deixar o frasco na posição vertical. Para começar o gotejamento, bater levemente com o dedo no fundo do frasco.

## Inalação - BISOLVON

Adultos: 4 ml (60 gotas), 2 vezes ao dia. Crianças acima de 12 anos: 2 ml (30 gotas), 2 vezes ao dia. Crianças de 6 a 12 anos: 1 ml (15 gotas), 2 vezes ao dia. Crianças de 2 a 6 anos: 10 gotas, 2 vezes ao dia. Crianças menores de 2 anos: 5 gotas, 2 vezes ao dia. É aconselhável aquecer a solução inalatória à temperatura corporal antes de se iniciar a inalação. Aos pacientes com asma brônquica recomenda-se iniciar a inalação após a administração da medicação broncoespasmolítica habitual. As gotas podem ser

diluídas em uma solução salina **fisiológica**, numa proporção de 1:1. Para evitar uma precipitação, a solução deve ser inalada imediatamente após a mistura. A aplicação combinada de inalação com uso oral do produto intensifica o efeito e é particularmente útil para os casos em que se deseja obter um efeito rápido.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os **sintomas**, procure orientação médica.

### **Superdosagem - BISOLVON**

Desconhecem-se casos de superdosagem e reações adversas graves. Entretanto, se ocorrerem, recomenda-se um tratamento sintomático.

Para sua segurança, mantenha esta embalagem até o uso total do medicamento.

BOEHRINGER INGELHEIM do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.