

Atenção diabéticos: CIFLOGEX® Pastilha contém açúcar, exceto CIFLOGEX® Pastilha Diet.

CIFLOGEX® Pastilha Diet, em sua formulação, substitui o açúcar pelo isomalt, que substitui na proporção de 1:1 com o mesmo volume e textura. Os diabéticos e outras pessoas que cuidam de sua saúde e que estão interessadas em evitar aumentos de glicose no sangue, como ocorre após o consumo do açúcar, podem utilizar CIFLOGEX® Pastilha Diet, pois as enzimas humanas digerem o isomalt em quantidades muito menores e mais lentamente que no caso do açúcar, portanto, após o consumo de CIFLOGEX® Pastilha Diet, os níveis de insulina e açúcar no sangue não são alterados.

Deixar a pastilha dissolver lentamente na boca, 3 ou mais vezes ao dia.

Superdosagem:

Se houver ingestão acidental de doses elevadas pode ocorrer agitação, ansiedade, alucinação e convulsão. Neste caso, procurar o médico imediatamente e seguir procedimento apropriado.

Pacientes Idosos:

Ainda não foram realizados estudos adequados relacionando a idade com os efeitos do uso em pacientes idosos. Entretanto, nenhum problema específico foi relatado até o momento.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Nº lote, data de fab. e prazo de validade: vide embalagens

Reg. MS nº 1.4381.0080

Farm. Resp. Charles Ricardo Mafra - CRF-MG nº 10.883

Registrado por: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda.

Rua Engenheiro Prudente, 121 - CEP: 01550-000

São Paulo/SP - CNPJ: 02.814.497/0001-07

Fabricado por: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda.

Av. Cel. Armando Rubens Storino, 2750 - Pouso Alegre/MG

CEP 37550-000 - CNPJ: 02.814.497/0002-98

Indústria Brasileira - ® Marca Registrada



1301050BU0711 - 185 x 130 - PH 116

CIFLOGEX®

cloridrato de benzidamina



Formas Farmacêuticas e Apresentações:

Spray: Frasco de 30 e 100mL - sabores: mel/ menta

Pastilha: Caixa com 12 pastilhas - sabores: cereja/ laranja/ mel-limão/ menta-limão/ menta-limão diet; Display com 180 pastilhas - sabores: laranja/ mel-limão/ menta-limão

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Spray - Uso tópico

Pastilha - Uso oral

Composições :

Cada mL de CIFLOGEX® Spray contém:

cloridrato de benzidamina.....1,5mg
Veículo*q.s.p.....1mL
*álcool etílico, corante, glicerol, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, ciclamato de sódio, sorbitol e água deionizada. CIFLOGEX® Spray sabor mel contém aroma de mel. CIFLOGEX® Spray sabor menta contém óleo de rícino hidrogenado e mentol.

Cada pastilha de CIFLOGEX® Pastilha contém:

cloridrato de benzidamina.....3mg
Excipientes*q.s.p.....1 pastilha
*aroma, corante, sacarose e talco farmacêutico.

Cada pastilha de CIFLOGEX® Pastilha Diet contém:

cloridrato de benzidamina.....3mg
Excipientes*q.s.p.....1 pastilha
*aroma, corante, aspartame, talco farmacêutico e isomalt.

Informações ao paciente:

CIFLOGEX® age como antiinflamatório tópico e analgésico local. Indicado no tratamento local de processos inflamatórios tumefativos e dolorosos localizados na boca e garganta; afecções odontostomatológicas (gengivites, glossites, estomatites, doenças periodontais, etc.); auxiliar na terapia dentária conservadora e extrativa; afecções otorrinolaringológicas, anginas, faringites, laringites e amigdalites; inflamações das mucosas da cavidade oral provocadas por fatores físicos (radioterapia, intubação, etc.); alívio da tosse. Sua ação e alívio dos sintomas são observados logo após as primeiras doses.

Cuidados de conservação: Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

O prazo de validade está gravado nas embalagens. Não use medicamento com o prazo vencido.

Informar ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis tais como: insônia, tontura, náusea e taquicardia.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Este medicamento é contraindicado nos casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

Não deve ser usado durante a gravidez e a lactação.

O uso pediátrico de CIFLOGEX® Pastilha é recomendado para maiores de 6 anos. CIFLOGEX® Pastilha (sabores mel-limão, menta-limão e menta-limão diet) e CIFLOGEX® Spray (sabor menta) contém em sua formulação o corante amarelo TARTRAZINA, que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico. **Atenção diabéticos:** CIFLOGEX® Pastilha contém açúcar, exceto CIFLOGEX® Pastilha Diet.

CIFLOGEX® Pastilha Diet, em sua formulação, substitui o açúcar pelo isomalt, que substitui na proporção de 1:1 com o mesmo volume e textura. Os diabéticos e outras pessoas que cuidam de sua saúde e que estão interessadas em evitar aumentos de glicose no sangue, como ocorre após o consumo do açúcar, podem utilizar CIFLOGEX® Pastilha Diet, pois as enzimas humanas digerem o isomalt em quantidades muito menores e mais lentamente que no caso do açúcar, portanto, após o consumo de CIFLOGEX® Pastilha Diet, os níveis de insulina e açúcar no sangue não são alterados.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

Informações Técnicas

Características:

CIFLOGEX® tem como princípio ativo o cloridrato de benzidamina, derivado do indazol, contendo um grupo benzílico e uma cadeia oxipropanamínica. Não pertence à classe dos esteróides, não apresentando, portanto, os efeitos colaterais destes compostos. Possui ação antiinflamatória e analgésica, sendo amplamente usado no tratamento de afecções que apresentam como fator comum a dor e tumefação. Exerce ação anestésica local e histoprotetora, estimula a cicatrização e acelera o processo de recuperação dos tecidos lesados.

Indicações:

Analgésico e anti-inflamatório tópico nas afecções bucofaringeas e alívio da tosse. Odontologia: aftas, glossites, estomatites, gengivites de diferentes etiologias, periodontopatias, tratamento auxiliar da terapêutica dentária conservadora e extrativa e hipersensibilidade da dentina.

Otorrinolaringologia: anginas, amigdalites, faringites e laringites.



Contraindicações:

Hipersensibilidade comprovada à benzidamina (pastilha e spray).

Gravidez, lactação e insuficiência hepática ou renal grave (pastilha).

Precauções e Advertências:

O uso prolongado pode causar fenômenos de sensibilização, nesse caso, o tratamento deve ser interrompido e devem ser adotadas as medidas de segurança.

Sendo a benzidamina absorvida pela mucosa oral e excretada praticamente inalterada na urina, deve-se levar em consideração uma possível ação sistêmica em pacientes com insuficiência renal.

CIFLOGEX® Pastilha (sabores mel-limão, menta-limão e menta-limão diet) e CIFLOGEX® Spray (sabor menta) contém em sua formulação o corante amarelo TARTRAZINA, que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico. Atenção diabéticos: CIFLOGEX® Pastilha contém açúcar, exceto CIFLOGEX® Pastilha Diet.

CIFLOGEX® Pastilha Diet, em sua formulação, substitui o açúcar pelo isomalt, que substitui na proporção de 1:1 com o mesmo volume e textura. Os diabéticos e outras pessoas que cuidam de sua saúde e que estão interessadas em evitar aumentos de glicose no sangue, como ocorre após o consumo do açúcar, podem utilizar CIFLOGEX® Pastilha Diet, pois as enzimas humanas digerem o isomalt em quantidades muito menores e mais lentamente que no caso do açúcar, portanto, após o consumo de CIFLOGEX® Pastilha Diet, os níveis de insulina e açúcar no sangue não são alterados.

Interações Medicamentosas:

Não há relatos até o momento.

Interferência em exames:

Não há relatos até o momento.

Reações Adversas/ Colaterais:

A tolerância do organismo ao CIFLOGEX® é muito boa, entretanto alguns pacientes mais sensíveis podem apresentar, quando fizer uso de CIFLOGEX® Pastilha, reações ocasionais ou raras como: náuseas, sensação de queimação, ardor epigástrico, insônia e tontura.

Posologia:

Via de administração:

Spray - Uso tópico

Pastilha - Uso oral.

Spray:

Fazer 2 e 6 nebulizações ao dia nas áreas inflamadas da boca e garganta.

Pastilha:

CIFLOGEX® Pastilha (sabores mel-limão, menta-limão e menta-limão diet) contém em sua formulação o corante amarelo TARTRAZINA, que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.